

## ◎スミレ【堇】

*Viola mandshurica*



- 花 期 4月中旬～6月中旬
- 生育地 平野部から山地までの草原などの日当たりの良い所
- 特 徴 平野部の公園や耕作地に多く、山地の草地や草原まで比較的乾燥した日当たりの良い所に幅広く分布している。舗装された道路の片隅などでも生育している。  
花は大型で濃い紫色。唇弁中央は白く抜けて紫条が入り、側弁に毛がある。葉はへら形で葉には軟毛が生えているものが多い。花の色や葉の形毛の有無などは変化が多いが、葉柄にははつきりとした翼があり、これが特徴の一つ。
- 分 布 県内各地

## ○ホコバスマシレ【鉾羽堇】

*Viola mandshurica* var. *ikedana*

- 花 期 4月中旬～5月上旬
- 生育地 日当たりの良い所
- 特 徴 少し小型で葉が鉾形になったスミレの変種。西日本の標高の草原に多いタイプらしいが、群馬では芝生の中にあつたので移入かも。
- 分 布 西部



## ケナシスミレ【毛無堇】

*Viola mandshurica* f. *glabra*



- 花 期 4月中旬～4月下旬
- 生育地 山地の落葉樹の林床
- 特 徴 スミレの中で毛が無いタイプの品種。群馬では比較的標高の高い所に多い。
- 分 布 中部、西部